

FÍSTULA ONFALOMESENTÉRICA EN RECIÉN NACIDO PREMATURO

Dulce Ivonne Matías Hipólito¹, Luz María Huacuz Herrera¹

¹Hospital Regional No. 58 IMSS León

Bol Cient Cult Col Ped Gto 2024;Suppl 1:11

INTRODUCCIÓN

Incidencia 13% de lactantes menores ya que este hallazgo se realiza al mes de vida, no al nacimiento.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Un día de vida extra uterina, 33 semanas de gestación, madre hipotiroidea con hipertensión de 10 años de evolución. Al introducir catéter umbilical venoso con hallazgo de meconio por ambos vasos umbilicales arteria y vena, sin presencia de evacuación, control radiográfico con datos sugerentes de atresia intestinal. Se realiza laparotomía exploradora confirmando la posibilidad diagnóstica.

DISCUSIÓN

Es poco frecuente menos de 5% del diagnóstico perinatal o al nacimiento. Ingresa la unidad de cuidados intensivos por síndrome de dificultad respiratoria y al realizar colocación de catéter umbilical se realiza este hallazgo; se realiza ligadura de la fístula y su evolución fue hacia la mejoría. A los 5 días inicio adecuada tolerancia a la vía oral.

CONCLUSIÓN

Realización de un control prenatal al menos una ocasión por perinatologo, es una ventana de oportunidad para estos casos ya que acuden al ser lactantes con compromiso abdominal. Al realizar un tamizaje de malformaciones abdominales, intestinales se puede mejorar el pronóstico.